

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION de la STATION de BORDEAUX (Tél. 92-26-94)

(GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&GARONNE, LANDES,
BASSES-PYRÉNÉES, CHARENTE, CHARENTE-MARITIME)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Chemin d'Artigues, CENON (Gironde)

C. C. P. : BORDEAUX 6707-65

ABONNEMENT ANNUEL

12 NF

DLP 18-2-63 185019

Supplément N° 2 au Bulletin Technique N° 20 de Mai 1962

1962 - 13

AVERTISSEMENTS

I - VIGNE -

Mildiou : L'évolution des oeufs d'hiver lente jusqu'à présent pourrait être activée par la dernière période pluvieuse dès que la température se relèvera.

Des germinations ont même pu se produire dans certains vignobles bien exposés.

Nous conseillons donc, pour protéger la végétation déjà très active d'effectuer un premier traitement et notamment dans les vignes habituellement envahies. Cette application est particulièrement nécessaire dans les îles atlantiques.

Supprimer le plus possible les pousses basses et faciliter l'écoulement des eaux aux bouts des sillons.

Black-Rot : Le traitement ci-dessus sera également valable contre le Black-Rot.

INFORMATIONS

Oïdium : Si le traitement conseillé dans notre dernier avis n'a pu être appliqué il convient de l'effectuer sans retard.

Acariose : Dans plusieurs vignobles on observe de nombreuses pousses rabougries portant de petites feuilles crispées.

Il s'agirait des dégâts d'un Acarien qui, généralement, est détruit par les traitements de fin d'hiver. Actuellement on peut réduire les attaques en appliquant une spécialité à base de Parathion ou un soufrage par temps chaud.

Glandes perlées : La végétation active et l'humidité ont favorisé la formation de gouttelettes brillantes sur les feuilles et les jeunes rameaux. Il ne faut pas confondre ces exsudations avec des oeufs d'insectes.

II - POMMES DE TERRE -

Mildiou : Dans toutes les cultures de primeurs suffisamment développées, il convient de prévoir dès à présent un traitement pour éviter les attaques de Mildiou.

III - ARBRES FRUITIERS -

Rouille du Prunier : Contre la Rouille du Prunier, appliquer une Bouillie bordelaise à 1%, ou encore une spécialité à base de Zinèbe ou de Zirame.

AVERTISSEMENTS

Tavelures des Poiriers et des Pommiers : Les fortes pluies de ces derniers jours ont délavé les produits de traitements. Il convient donc de faire un nouveau traitement pour protéger suffisamment la végétation.

Le Contrôleur
chargé des Avertissements
C. ROUSSEL

Imprimerie de la Station de BORDEAUX
Directeur-Gérant : L. BOUYX

Bordeaux, le 17 Mai 1962
L'Inspecteur
de la Protection des Végétaux
J. BRUNETEAU

160